



MAPBIOMAS
PARAGUAY

EXPLORANDO LAS DIMENSIONES TERRITORIALES: UN ANÁLISIS DETALLADO DEL USO DE SUELO EN PARAGUAY


COLECCIÓN 3

Aspectos destacados del mapeo anual de la cobertura y el uso
del suelo en el Paraguay desde 1985 al 2025

Para más información: <https://paraguay.mapbiomas.org/>


10.09.2026

CAMBIO DE LA COBERTURA Y USO DEL SUELO EN EL PARAGUAY (1985 - 2025)



- Leñosas cerradas
- Leñosas abiertas
- Leñosas inundables
- Forestaciones
- Veg. Herbácea Natural
- Pastizales inundables
- Pastizal
- Pastura
- Agricultura
- Área sin vegetación
- Cuerpo de agua

Cobertura y uso del suelo en Paraguay en 1985, 2005 y 2025



CAMBIO DE LA COBERTURA Y USO DEL SUELO EN EL PARAGUAY (1985-2025)


Paraguay perdió
8,87 Mha
(30%) de Vegetación
Leñosa Natural

Las Áreas
Agropecuarias
aumentaron
9,59 Mha
(243%) 1985-2025


Entre 2005-2025
se perdió
5,09 Mha
(20%) de Vegetación
Leñosa Natural

Entre 2005-2025
aumentó
5,73 Mha
(73%) del uso
Agropecuario


**Vegetación Leñosa Natural
en Paraguay entre 1985 y 2025**



**Uso Agropecuario
en Paraguay entre 1985 y 2025**




CAMBIO DE LAS VEGETACIONES LEÑOSAS CERRADAS EN PARAGUAY (1985-2025)




Las Leñosas Cerradas en Paraguay se redujeron de 24,78 Mha (1985) a 15,60 Mha (2025): una **pérdida de 9,18 Mha (37%)**


PARAGUAY



REGIÓN OCCIDENTAL




REGIÓN ORIENTAL



REMANENTES Y PÉRDIDAS DE LA VEGETACIÓN LEÑOSA POR DISTRITO (1985-2025)

PORCENTAJE DE VEGETACIÓN LEÑOSA NATURAL REMANENTE EN 2025 POR DISTRITO



Distrito con mayor remanente al 2025:


Bahía Negra

3,19 Mha (88%)

Distritos con mayor remanente absoluto de vegetación leñosa en 2025:

Bahía Negra 3,19 Mha (88%) · Mcal. Estigarribia 3,17 Mha (67%) · Fuerte Olimpo 1,65 Mha (70%) · Villa Hayes 1,48 Mha (92%)

PORCENTAJE DE PÉRDIDA DE LA VEGETACIÓN LEÑOSA NATURAL ENTRE 1985 Y 2025 POR DISTRITO



Distrito con mayor pérdida 1985-2025:

Mcal. Estigarribia


-1,57 Mha (33%)

Distritos con mayor pérdida absoluta de vegetación leñosa entre 1985 y 2025 :

Mcal. Estigarribia -1,57 Mha (33%) · Boquerón -0,92 Mha (42%) · Fuerte Olimpo -0,71 Mha (30%)

CAMBIO DE LA COBERTURA Y USO DEL SUELO EN EL PARAGUAY (1985-2025)

Cobertura y uso del suelo en Paraguay entre 1985 y 2025 (nivel 1)



La clase que más aumentó:

Agropecuario ▲


La clase que más disminuyó:

Leñosas Cerradas ▼

En 40 años, la
cobertura natural
(leñosa + herbácea)
pasó de 89% a 65%
del territorio,
mientras el uso
agropecuario se
cuadruplicó.

CAMBIO DEL USO AGROPECUARIO EN PARAGUAY Y SUS REGIONES (1985 - 2025)


Uso agropecuario en Paraguay en 1985, 2005 y 2025




En Paraguay el uso agropecuario aumentó **9,59 Mha (243%)** entre 1985 y 2025

Región Oriental
aumentó
**+3,85
Mha**
(128%) 1985-2025

Uso agropecuario en la Región Oriental en 1985, 2005 y 2025




Uso agropecuario en la Región Occidental en 1985, 2005 y 2025



Región Occidental:
con mayor
crecimiento
relativo
+5,73 Mha
(615%) 1985-2025

EXPANSIÓN DE LAS ÁREAS AGRÍCOLAS EN EL PARAGUAY (1985-2025)



Pastura



Agricultura

El uso agropecuario
(pastura + agricultura
+ forestaciones) creció
de **3,94 a 13,53 Mha**
entre 1985 y 2025

La agricultura se
concentra en la
**Región
Oriental**
y el norte oriental

La pastura domina
la expansión en el
Chaco
(Región Occidental)

La agricultura se
expande sobre la
Región Oriental,
mientras la pastura
avanza en el Chaco
central y norte.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA METODOLOGÍA DE LA COLECCIÓN 3 DE MAPBIOMAS PARAGUAY

1

Trabajo colaborativo en red

Con especialistas de distintas instituciones de Paraguay

2

Información anual de cobertura y uso del suelo entre 1985-2025

Resolución de 30 m

3

Procesamiento de imágenes Landsat disponibles en 41 años

Landsat 5, 7, 8 y 9

4

Procesamiento en la nube con algoritmos de inteligencia artificial

Plataforma Google Earth Engine

Colección 3: Mapeo de cobertura y uso del suelo de Paraguay desde 1985 al 2025. Metodología: Machine Learning – Random Forest. El proyecto cuenta con un sitio web de consulta pública (<https://paraguay.mapbiomas.org/>) con las clases mapeadas, mapas, referencias y estadísticas sobre la cobertura y uso del suelo y sus transiciones a diferentes escalas espaciales.

CITAR COMO:

"Proyecto MapBiomas Paraguay – Colección 3 de la Serie Anual de Mapas de Cobertura y Uso del Suelo de Paraguay, adquirido en [fecha] a través del link: [LINK]"

Conozca más en <https://paraguay.mapbiomas.org/>